


Bovina




Specie poliestrale annuale

Lunghezza del ciclo (gg)	Durata dell'estro (ore)	Momento dell'ovulazione
21-22	18-19	10-11 ore dopo la fine dell'estro



Ciclo estrale in bovino





#1 Sign of Heat

✓ Standing to be mounted

Secondary Signs of Heat

- ✓ Mounting other cows
- ✓ Red, swollen vulva
- ✓ Clear mucous discharge
- ✓ Increased motor activity
- ✓ Roughed up tail head
- ✓ Increased vocalization
- ✓ Chin rubbing
- ✓ Dirty flanks and sides from being mounted by other cows






Scrofa

Specie poliestratale annuale

Lunghezza del ciclo (gg)	Durata dell'estro (ore)	Momento dell'ovulazione
19-21	48-72	35-45 ore dall'inizio dell'estro







Anestro da lattazione





FIGURA 4.8. Correlazioni endocrine durante il *post-partum* nella **scrofa**. All'inizio dell'allattamento la prolattina viene secreta attivamente mentre la secrezione di gonadotropine è scarsa; in questa fase si osserva un **anestro da lattazione** e l'involuzione dell'utero non è ancora completata. La secrezione di gonadotropine e di prolattina si modifica quando diminuisce l'incidenza dell'allattamento (Hunter RHF. *Reproduction in farm animals*. New York: Longman, 1982).

Cavalla

Specie poliestrale stagionale

Lunghezza del ciclo (gg)	Durata dell'estro (ore)	Momento dell'ovulazione
19-25	4-8 gg	1-2 gg dopo la fine dell'estro







<https://www.equine-reproduction.com/articles/Ovulation.shtml>

Flemen



Gatta

Specie poliestrale stagionale

Ovulazione indotta



Hormonal Changes during Estrous Cycle and Pregnancy

