

ANAMNESI: gregge di 500 pecore
 profilassi diretta
 pascolo
 gruppi di monta

SEGNALAMENTO

Razza: sarda

Età: 2 anni

Sesso: femmina

Uso: latte



1

STATO PRESENTE


E.O.G: nella norma, con notevole aumento
 dell'addome

E.O.P: perdite di liquidi dalla rima vulvare


ESAME GINECOLOGICO: formazione
 voluminosa di consistenza duro fibrosa non
 riferibile a parti fetali

RICERCHE COLLATERALI: esame
 ecografico

2



3



4

Taglio Cesareo nella pecora

- La pratica del taglio cesareo nella pecora da carne è circoscritta ai soggetti di alto valore genetico dal momento che una pecora da riforma è valutata intorno ai 45 euro.
- Per le pecore da latte la problematica è diversa, la lattazione di una stagione è remunerata con 150-190 euro a questo si aggiunge il valore degli agnelli e del soggetto stesso

5

Materiale e Strumentario

- Fermateli
- Manico di bisturi e lama
- Due paia di forbici a punta smussa
- Cinque Kocher
- Cinque Klemmer
- Portaghi
- Materiale da sutura (Vycril 4 0 5) (USP 1 0 2), seta
- Siringhe
- Lidocaina
- Teli sterili

6


Preparazione

- attraverso la corda del fianco sx o dx (la pecora è immobilizzata su un lato)



7

- Attraverso la via mediana o paramediana, in funzione della rete venosa mammaria (la pecora è immobilizzata sul dorso)
- I quattro arti sono fissati in estensione con delle corde
- Tricotomia del campo operatorio e preparazione “lege artis”



- Anestesia locale infiltrante sulla linea di incisione

8


Tecnica

- Cute e muscoli sono incisi per una lunghezza di 20-30 cm.
- Il peritoneo sollevato in plica ed inciso
- Evidenziazione del corno gravido e sua esteriorizzazione
- Incisione dell'utero sulla grande curvatura
- Estrazione dell'agnello/i
- Sutura dell'utero introflettente (Lembert modificata)
- Sutura continua dei muscoli
- Sutura della cute con materiale non riassorbibile


9

Ultimato il taglio cesareo con la nascita di due agnelli vivi e vitali, prima di suturare la breccia addominale si procedette a liberare il canale vaginale

10



11



12

Aiutandosi per via addominale con una forza di spinta dal lato craniale della massa occludente, ed esercitando una trazione con forza adeguata sui capi liberi del nastro di Bhuner è stato possibile exteriorizzare non senza difficoltà la formazione


13



14



15




16

La pecora ha espulso le seconde fetali spontaneamente dopo circa 12 ore dall'intervento



17



Aspetto istologico del fibroma: bande spiralate ed intrecciate di fibroblasti e fibre collagene policrom (forte ingrandimento)

18

In seguito il soggetto ha partorito più volte normalmente ed un controllo al parto successivo all'intervento, eseguito facendo prollassare la cervice, dopo il secondamento, non evidenziò esiti dall'intervento




19



20



21



22



23



Utero: rimozione delle aree necrotiche e ricostruzione

24



25