

# **CAPITOLO VII**

## **DERIVATE**

### **1. GENERALITÀ**

*Definizione 1.1)*

La *derivata* è un operatore che ad una funzione  $f$  associa un'altra funzione e che obbedisce alle seguenti regole:

$$(1) \ D(a_0x^n) = (a_0x^n)' = na_0x^{n-1} \quad \text{derivata di un monomio}$$

#### **ESEMPI**

$$D(3x^2) = 2 \cdot 3 \cdot x^{2-1} = 6x$$

$$D(5x^4) = 4 \cdot 5 \cdot x^{4-1} = 20x^3$$

$$D(-4x^3) = 3 \cdot (-4) \cdot x^{3-1} = -12x^2$$

$$(2) \ D(a_0x) = a_0 \quad \text{derivata di un monomio con } n = 1$$

#### **ESEMPI**

$$D(7x) = 1 \cdot 7 \cdot x^{1-1} = 7x^0 = 7 \cdot 1 = 7, \ D(10x) = 10, \ D(3x) = 3$$

$$(3) \ D(x) = 1 \quad \text{derivata di un monomio con } a_0 = 1 = n$$

$$(4) \ D(c) = 0 \quad \text{derivata di una costante}$$

#### **ESEMPI**

$$D(4) = 0, \ D(10) = 0, \ D(25) = 0$$

$$(5) \ D(x^n) = nx^{n-1} \quad \text{derivata di un monomio con } a_0 = 1$$

Più in generale risulta:

$$(5.1) \ D(x^a) = a x^{a-1} \quad (\text{a reale qualsiasi})$$

Ricordando le regole delle potenze:

$$a) a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$b) a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$c) a^{-\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a}}$$

seguono varie proprietà applicate nei seguenti

### **ESEMPI**

$$D(x^3) = 3x^{3-1} = 3x^2, D(x^5) = 5x^{5-1} = 5x^4, D(x^8) = 8x^{8-1} = 8x^7, D(x^{\sqrt{2}}) = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1},$$

$$D(x^{1+\sqrt[3]{2}}) = (1+\sqrt[3]{2}) x^{\sqrt[3]{2}}$$

Se  $a = \frac{1}{n}$  allora si ha:

$$D\left(x^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n} x^{\frac{1-n}{n}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{x^{\frac{n-1}{n}}}$$

che si può scrivere, in modo più semplice, come segue:

$$(6) D(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}} \quad \text{derivata della radice n-esima}$$

### **ESEMPI**

$$D(\sqrt{x}) = \frac{1}{2 \sqrt{x^{2-1}}} = \frac{1}{2 \sqrt{x}}, D(\sqrt[3]{x}) = \frac{1}{3 \sqrt[3]{x^{3-1}}} = \frac{1}{3 \sqrt[3]{x^2}}, D(\sqrt[5]{x}) = \frac{1}{5 \sqrt[5]{x^{5-1}}} = \frac{1}{5 \sqrt[5]{x^4}}$$

Più in generale si ottiene:

$$(7) D\left[\sqrt[n]{f(x)}\right] = \frac{f'(x)}{n \sqrt[n]{[f(x)]^{n-1}}} \quad \text{derivata della radice n-esima di una funzione}$$

### **ESEMPI**

$$D(\sqrt{x^3 - 4x + 2}) = \frac{(x^3 - 4x + 2)^{\frac{1}{2}}}{2 \sqrt{(x^3 - 4x + 2)^{2-1}}} = \frac{3x^2 - 4}{2 \sqrt{x^3 - 4x + 2}}$$

$$D \left( \sqrt[3]{4x^3 + 6x^2 - 5} \right) = \frac{(4x^3 + 6x^2 - 5)^{\frac{1}{3}}}{3 \sqrt[3]{(4x^3 + 6x^2 - 5)^{3-1}}} = \frac{12x^2 + 12x}{3 \sqrt[3]{(4x^3 + 6x^2 - 5)^2}} = \frac{4x^2 + 4x}{\sqrt[3]{(4x^3 + 6x^2 - 5)^2}}$$

$$D \left( \sqrt[5]{5x+3} \right) = \frac{(5x+3)^{\frac{1}{5}}}{5 \sqrt[5]{(5x+3)^{5-1}}} = \frac{5}{5 \sqrt[5]{(5x+3)^4}} = \frac{1}{\sqrt[5]{(5x+3)^4}}$$

(8)  $D [af(x) \pm b g(x)] = a Df(x) \pm b Dg(x)$  derivata della somma (o differenza) e linearità

### ESEMPI

$$D(5x^4 + 3x^2 + 7x + 6) = 5D(x^4) + 3D(x^2) + 7D(x) + 6D(1) = 20x^3 + 6x + 7$$

$$D(6x^3 - 2x^2 + 4x - 6) = 6D(x^3) - 2D(x^2) + 4D(x) - 6D(1) = 18x^2 - 4x + 4$$

$$D(-4x^3 + 7x) = -4D(x^3) + 7D(x) = -12x^2 + 7$$

(9)  $D[f(x)g(x)] = [f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$  derivata del prodotto

### ESEMPI

$$D[(x^2 - 1)(5x + 2)] = (x^2 - 1)'(5x + 2) + (x^2 - 1)(5x + 2)' = 2x(5x + 2) + (x^2 - 1)5 =$$

$$= 10x^2 + 4x + 5x^2 - 5 = 15x^2 + 4x - 5$$

$$D[(2x + 3)(x^2 + 2x)] = (2x + 3)'(x^2 + 2x) + (2x + 3)(x^2 + 2x)' = 2(x^2 + 2x) + (2x + 3)(2x + 2) =$$

$$= 2x^2 + 4x + 4x^2 + 4x + 6x + 6 = 6x^2 + 14x + 6$$

$$D[(3x^3 + 4x + 1)(3x^2 + 4)] = (3x^3 + 4x + 1)'(3x^2 + 4) + (3x^3 + 4x + 1)(3x^2 + 4)' =$$

$$= (9x^2 + 4)(3x^2 + 4) + (3x^3 + 4x + 1)6x = 27x^4 + 36x^2 + 12x^2 + 16 + 18x^4 + 24x^2 + 6x =$$

$$= 45x^4 + 72x^2 + 6x + 16$$

(10)  $D \left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0$  derivata del quoziente

**ESEMPI**

$$D\left(\frac{x}{x^2+1}\right) = \frac{(x)|(x^2+1)-x(x^2+1)|}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2+1-x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$$

$$D\left(\frac{x^3}{4-x}\right) = \frac{(x^3)|(4-x)-x^3(4-x)|}{(4-x)^2} = \frac{3x^2(4-x)-x^3(-1)}{(4-x)^2} = \frac{-2x^3+12x^2}{(4-x)^2}$$

$$\begin{aligned} D\left(\frac{1+x^2}{4+x^2}\right) &= \frac{(1+x^2)|(4+x^2)-(1+x^2)(4+x^2)|}{(4+x^2)^2} = \frac{2x(4+x^2)-(1+x^2)2x}{(4+x^2)^2} = \\ &= \frac{6x}{(4+x^2)^2} \end{aligned}$$

(11)  $Df[g(x)] = f'[\dots] g'[\dots] = f'[g(x)] g'(x)$  *derivata di funzioni composte*

**ESEMPI**

$$D\left(\sqrt{4x^2-3}\right) = \left[(4x^2-3)^{\frac{1}{2}}\right]' = \frac{1}{2\sqrt{4x^2-3}}(4x^2-3)' = \frac{8x}{2\sqrt{4x^2-3}} = \frac{4x}{\sqrt{4x^2-3}}$$

$$\begin{aligned} D\left[\sqrt[5]{(2x^3+1)^2}\right] &= \left[\sqrt[5]{(2x^3+1)^2}\right]' = \left[(2x^3+1)^{\frac{2}{5}}\right]' = \frac{2}{5}(2x^3+1)^{-\frac{3}{5}}[(2x^3+1)]' = \\ &= \frac{2}{5\sqrt[5]{(2x^3+1)^3}}6x^2 = \frac{12x^2}{5\sqrt[5]{(2x^3+1)^3}} \end{aligned}$$

$$D\left(\sqrt[3]{x^2-7x}\right) = \left[(x^2-7x)^{\frac{1}{3}}\right]' = \frac{1}{3}(x^2-7x)^{\frac{1}{3}-1}(x^2-7x)' = \frac{2x-7}{3\sqrt[3]{(x^2-7x)^2}}$$

$$D\left[(3x^2-x)^5\right] = 5(3x^2-x)^{5-1}(3x^2-x)' = 5(3x^2-x)^4(6x-1)$$

(12)  $D\left[e^{f(x)}\right] = e^{f(x)}f'(x)$  *derivata di funzioni esponenziali*

**ESEMPI**

$$D\left(e^{x^2+5x+2}\right) = e^{x^2+5x+2}(x^2+5x+2)' = e^{x^2+5x+2}(2x+5)$$

$$D\left(e^{3x^3+7x}\right) = e^{3x^3+7x}(3x^3+7x)' = e^{3x^3+7x}(9x^2+7)$$

$$\begin{aligned}
D \left( e^{\frac{x^3+3}{x^2+1}} \right) &= e^{\frac{x^3+3}{x^2+1}} \left( \frac{x^3+3}{x^2+1} \right)' = e^{\frac{x^3+3}{x^2+1}} \left[ \frac{3x^2(x^2+1) - (x^3+3) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} \right] = e^{\frac{x^3+3}{x^2+1}} \frac{x^4 + 3x^2 - 6x}{(x^2+1)^2} \\
D \left( e^{\frac{2x^2+4x}{3x^2+5}} \right) &= e^{\frac{2x^2+4x}{3x^2+5}} \left( \frac{2x^2+4x}{3x^2+5} \right)' = e^{\frac{2x^2+4x}{3x^2+5}} \left[ \frac{4x(3x^2+5) - (2x^2+4x) \cdot 6x}{(3x^2+5)^2} \right] = \\
&= e^{\frac{2x^2+4x}{3x^2+5}} \frac{-24x^2 + 20x}{(3x^2+5)^2}
\end{aligned}$$

(13)  $D [\ln f(x)] = \frac{f'(x)}{f(x)}$

*derivata di funzioni logaritmiche*

### ESEMPI

$$D [\ln(3x^2 + 2)] = \frac{1}{3x^2 + 2} (3x^2 + 2)' = \frac{6x}{3x^2 + 2}$$

$$D [\ln(x^3 - 2x - 1)] = \frac{1}{x^3 - 2x - 1} (x^3 - 2x - 1)' = \frac{3x^2 - 2}{x^3 - 2x - 1}$$

$$D \left[ \ln \left( \frac{2x^2 + 4x}{3x^2 + 5} \right) \right] = \frac{3x^2 + 5}{2x^2 + 4x} \left( \frac{2x^2 + 4x}{3x^2 + 5} \right)' = \frac{3x^2 + 5}{2x^2 + 4x} \frac{-24x^2 + 20x}{(3x^2 + 5)^2} = \frac{-24x^2 + 20x}{(2x^2 + 4x)(3x^2 + 5)}$$

*Osservazione:* riteniamo opportuno richiamare l'attenzione dello studente su alcune proprietà dei logaritmi che si riveleranno particolarmente utili soprattutto per lo studio di funzioni:

- $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c \quad \text{con } a, b > 0 \quad e \quad a \neq 1$
- $\log_a \left( \frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c \quad \text{con } a, b, c > 0 \quad e \quad a \neq 1$
- $\log_a(b^n) = n \log_a b \quad \text{con } a, b > 0 \quad e \quad a \neq 1 \quad e \quad n \text{ intero positivo}$
- $\log_a(\sqrt[n]{b}) = \frac{1}{n} \log_a b \quad \text{con } a, b > 0 \quad e \quad a \neq 1 \quad e \quad n \text{ intero positivo}$
- $\log_a a = 1 \quad \text{con } a > 0 \quad e \quad a \neq 1$
- $\log_a 1 = 0 \quad \text{con } a > 0 \quad e \quad a \neq 1$
- $\log_a 0 = -\infty \quad \text{con } a > 0 \quad e \quad a \neq 1$
- $\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b} \quad \text{formula del cambio di base con } N \text{ intero positivo}$

Inoltre, sfruttando la definizione classica di logaritmo, è facile verificare l'equivalenza delle seguenti espressioni:

$$z = \log_a b ; \quad a^z = b ; \quad a^{\log_a b} = b ;$$

In generale si è soliti indicare con  $\ln$  o anche con  $\log$  il logaritmo naturale o *Neperiano*, cioè in base  $e$ .

## 2. TABELLA DELLE DERIVATE PIÙ COMUNI

Riportiamo qui di seguito una tabella riassuntiva delle derivate di alcune funzioni elementari, scrivendo a sinistra la funzione e, nella stessa linea, a destra, la sua derivata:

$y = c$	$y' = 0$
$y = x$	$y' = 1$
$y = x^n, n \in \mathbb{N}$	$y' = nx^{n-1}$
$y = x^a, a \in \mathbb{R} \text{ e } x > 0$	$y' = a x^{a-1}$
$y = \sqrt{x}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$y = \sqrt[n]{x^m}, n > m$	$y' = \frac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$
$y = \sin x$	$y' = \cos x$
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
$y = \operatorname{tg} x$	$y' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
$y = \operatorname{ctg} x$	$y' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \operatorname{cotg}^2 x$
$y = e^x$	$y' = e^x$
$y = a^x, a > 0$	$y' = a^x \log a$
$y = x^x$	$y' = x^x (1 + \ln x)$
$y = \ln x, x > 0$	$y' = \frac{1}{x}$
$y = \log_a x, x > 0, a > 0, a \neq 1$	$y' = \frac{1}{x} \log_a e$

$$y = \arcsin x, -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y = \arccos x, 0 < y < \pi$$

$$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y = \arctan x$$

$$y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y = \operatorname{arccot} x$$

$$y' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Riportiamo adesso un elenco di derivate di funzioni elementari ottenuto dalla tabella precedente sostituendo alla variabile indipendente  $x$  una certa funzione  $f(x)$  di cui si conosca la derivata ed applicando poi la regola di derivazione delle funzioni composte:

$$y = [f(x)]^n$$

$$y' = n [f(x)]^{n-1} f'(x)$$

$$y = \sqrt{f(x)}$$

$$y' = \frac{f'(x)}{2 \sqrt{f(x)}}$$

$$y = \sqrt[n]{[f(x)]^m}$$

$$y' = \frac{m}{n \sqrt[n]{[f(x)]^{m-n}}}$$

$$y = \sin f(x)$$

$$y' = \cos f(x) f'(x)$$

$$y = \cos f(x)$$

$$y' = -\sin f(x) f'(x)$$

$$y = \tan f(x)$$

$$y' = \frac{1}{\cos^2 f(x)} f'(x)$$

$$y = \cot f(x)$$

$$y' = -\frac{1}{\sin^2 f(x)} f'(x)$$

$$y = \arcsin f(x)$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} f'(x)$$

$$y = \arccos f(x)$$

$$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} f'(x)$$

$$y = \arctan f(x)$$

$$y' = \frac{1}{1+[f(x)]^2} f'(x)$$

$$y = \operatorname{arccot} f(x)$$

$$y' = -\frac{1}{1+[f(x)]^2} f'(x)$$

$$y = e^{f(x)}$$

$$y' = e^{f(x)} f'(x)$$

$$y = a^{f(x)}$$

$$y' = a^{f(x)} \ln a f'(x)$$

$$y = \ln f(x)$$

$$y' = \frac{1}{f(x)} f'(x)$$

$$y = \log_a f(x)$$

$$y' = \frac{1}{f(x)} \log_a e f'(x)$$

$$y = [f(x)]^{g(x)}$$

$$y' = [f(x)]^{g(x)} \left[ g'(x) \log f(x) + \frac{g(x)}{f(x)} f'(x) \right]$$

## ESERCIZI PROPOSTI

*Calcolare le derivate delle seguenti funzioni polinomiali:*

- $y = 3x^2 + 1$  [6x]
- $y = 5x + 7$  [5]
- $y = 2x - 5$  [2]
- $y = 3x^2 - 6x + 4$  [6x - 6]
- $y = 4x^3 - 2x^2 + 5x - 3$   $[12x^2 - 4x + 5]$
- $y = 4x^2 - 1$  [8x]
- $y = 1 + x + x^2$  [1 + 2x]
- $y = x^3 - 2x$   $[3x^2 - 2]$
- $y = 3x - 1$  [3]
- $y = 4x^2$  [8x]
- $y = 4x^2 + 5$  [8x]
- $y = x^5 + 4x^2$   $[5x^4 + 8x]$
- $y = x^3 + 2x^2 + 1$   $[3x^2 + 4x]$
- $y = 3x^4 - 5x^3 + 4x - 7$   $[12x^3 - 15x^2 + 4]$
- $y = 8x^5 - 24x^3 + 7$   $[40x^4 - 72x^2]$
- $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + 5x + 9$   $[x + x^2 + 5]$
- $y = (2x + 3)(x^2 + 3x - 1)$   $[6x^2 + 18x + 7]$
- $y = (x^2 - 1)(5x + 2)$   $[15x^2 + 4x - 5]$
- $y = (x^2 + 1)^5$   $[10x(x^2 + 1)^4]$
- $y = \frac{5x^3}{4} - \frac{7x^2}{2} - \frac{3x}{5} + 9$   $\left[ \frac{15}{4}x^2 - 7x - \frac{3}{5} \right]$
- $y = x(x - 1)^3$   $[(\boxed{4x-1})(x - 1)^2]$
- $y = (1 + x^2)(2x - 5)$   $[6x^2 - 10x + 2]$
- $y = (2x - 1)^2(3 - 7x)^5$   $[(2x - 1)(3 - 7x)^4(-98x + 47)]$
- $y = (2x + 3)(x^2 + 3x - 1)$   $[6x^2 + 18x + 7]$
- $y = (1 - 2x^2)(3x + 1)$   $[-18x^2 - 4x + 3]$

$y = (3 - 2x - x^2)(x^4 - 2x^2)$	$[2x(-3x^4 - 5x^3 + 10x^2 + 6x - 6)]$
$y = x^2(4 + x)(5x + 1)$	$[x(20x^2 + 63x + 8)]$
$y = (8x - 1)^{10}$	$[80(8x - 1)^9]$
$y = (x - 1)^2(x - 2)$	$[(x - 1)(3x - 5)]$
$y = (5 + x^3)(1 - 2x - 4x^3)^2$	$[(1 - 2x - 4x^3)(-36x^5 - 10x^3 - 117x^2 - 20)]$
$y = (1 - 3x)^4(1 + x)$	$[(11 + 15x)(3x - 1)^3]$
$y = (2 - x)^2(x^3 + 2x)$	$[(2 - x)(-5x^3 + 6x^2 - 6x + 4)]$
$y = (x - 2)^3(x + 1)^2$	$[(x + 1)(x - 2)^2(5x - 1)]$
$y = (x^2 + x + 1)^3(x - 1)^4$	$[(x^2 + x + 1)^2(x - 1)^3(10x^2 + x + 1)]$
$y = (x^6 + 1)(3x + 1)^8$	$[6(3x + 1)^7(7x^6 + x^5 + 4)]$
$y = (x^2 + 2x - 3)^3(4 - x^2)^7$	$[2(12 + 33x - 17x^2 - 10x^3)(x^2 + 2x - 3)^2(4 - x^2)^6]$
$y = 2(x + 2)^2(x^2 + 4x - 3)$	$[4(x + 2)(2x^2 + 8x + 1)]$
$y = x^2(x^4 + 1)^3 + 3x(x^2 + 1)$	$[2x(x^4 + 1)^2(7x^4 + 1) + 3(3x^2 + 1)]$

Calcolare le derivate delle seguenti funzioni razionali fratte:

$y = \frac{5}{x+1}$	$\left[ -\frac{5}{(x+1)^2} \right]$
$y = \frac{x+1}{2x}$	$\left[ -\frac{1}{2x^2} \right]$
$y = \frac{x-3}{x-4}$	$\left[ -\frac{1}{(x-4)^2} \right]$
$y = \frac{2x-3}{3x-4}$	$\left[ \frac{1}{(3x-4)^2} \right]$
$y = \frac{x+1}{x-3}$	$\left[ -\frac{4}{(x-3)^2} \right]$
$y = \frac{3x-4}{x^2-1}$	$\left[ \frac{x(5-3x)}{(x^2-1)^2} \right]$

$$y = \frac{1}{x^2 - 1} \quad \left[ -\frac{2x}{(x^2 - 1)^2} \right]$$

$$y = \frac{4x^2 + 1}{x} \quad \left[ \frac{(2x+1)(2x-1)}{x^2} \right]$$

$$y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 1} \quad \left[ \frac{x^2 + 2x - 2}{(x+1)^2} \right]$$

$$y = \frac{(1-x)^2}{x} \quad \left[ \frac{(x-1)(x+1)}{x^2} \right]$$

$$y = \frac{3x^2 - 5}{x^2 - 1} \quad \left[ \frac{4x}{(x^2 - 1)^2} \right]$$

$$y = \frac{4x^2 - 5x + 3}{x^2 - 6x + 5} \quad \left[ -\frac{19x^2 - 34x + 7}{(x^2 - 6x + 5)^2} \right]$$

$$y = \frac{3x^2 - 2x + 3}{x^2 - 2x - 1} \quad \left[ -\frac{4(x^2 + 3x - 2)}{(x^2 - 2x - 1)^2} \right]$$

$$y = \frac{1}{x} \quad \left[ -\frac{1}{x^2} \right]$$

$$y = \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{x} + x^3 \quad \left[ \frac{3x^5 + 3x - 1}{x^3} \right]$$

$$y = 3x^2 + 9x + \frac{1}{x} \quad \left[ \frac{6x^3 + 9x^2 - 1}{x^2} \right]$$

$$y = \frac{x^2 + x^6 - 3x^3}{x^4} \quad \left[ -\frac{2}{x^3} + 2x + \frac{3}{x^2} \right]$$

$$y = x^3 - 2x - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^3} \quad \left[ 3x^2 - 2 + \frac{5}{x^2} - \frac{6}{x^4} \right]$$

$$y = \frac{2x}{3-x} \quad \left[ \frac{6}{(3-x)^2} \right]$$

$$y = \frac{1+x^2}{4+x^2} \quad \left[ \frac{6x}{(4+x^2)^2} \right]$$

$$y = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4} \quad \left[ \frac{16x}{(x^2 + 4)^2} \right]$$

$$y = \frac{x^3}{4-x} \quad \left[ \frac{2x^2(6-x)}{(4-x)^2} \right]$$

$$y = \frac{x^2 + 1}{5x - 7} \quad \left[ \frac{5x^2 - 14x - 5}{(5x - 7)^2} \right]$$

$$y = \frac{8x + x^5}{x + 1} \quad \left[ \frac{4x^5 + 5x^4 + 8}{(x + 1)^2} \right]$$

$$y = \frac{4x^2 - 5}{x + 1} \quad \left[ \frac{4x^2 + 8x + 5}{(x + 1)^2} \right]$$

$$y = 2x - \frac{x}{x^2 + 1} \quad \left[ \frac{2x^4 + 5x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} \right]$$

$$y = \left( 2x + \frac{5}{x} \right)^3 \quad \left[ 3 \left( 2x + \frac{5}{x} \right)^2 \left( 2 - \frac{5}{x^2} \right) \right]$$

$$y = \left( x - 1 - \frac{3}{x} \right)^4 \quad \left[ 4 \left( x - 1 - \frac{3}{x} \right)^3 \left( 1 + \frac{3}{x^2} \right) \right]$$

$$y = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4} \quad \left[ \frac{16x}{(x^2 + 4)^2} \right]$$

$$y = \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 1} \quad \left[ \frac{-x^2 - 6x - 1}{(x^2 - 1)^2} \right]$$

$$y = \frac{7}{(x^3 + 8)^2} \quad \left[ -\frac{42x^2}{(x^3 + 8)^3} \right]$$

$$y = \frac{x}{x^3 + x^2 + 2} \quad \left[ \frac{-2x^3 - x^2 + 2}{(x^3 + x^2 + 2)^2} \right]$$

$$y = \frac{x^3}{2x^2 - 3x + 1}$$

$$\left[ \frac{x^2(2x^2 - 6x + 3)}{(2x^2 - 3x + 1)^2} \right]$$

$$y = x^2 + 2 + \frac{x^3}{4-x}$$

$$\left[ \frac{4x(8-x)}{(4-x)^2} \right]$$

$$y = \frac{x^3 + x + 1}{x - 1}$$

$$\left[ \frac{2x^3 - 3x^2 - 2}{(x-1)^2} \right]$$

$$y = \frac{3x-1}{(4-5x)^2}$$

$$\left[ \frac{15x+2}{(4-5x)^3} \right]$$

$$y = \frac{4x^2 - 5}{x + 1}$$

$$\left[ \frac{4x^2 + 8x + 5}{(x+1)^2} \right]$$

$$y = 5(x^2 + 9) - \frac{7}{x}$$

$$\left[ \frac{10x^3 + 7}{x^2} \right]$$

$$y = \left( 2x + \frac{1}{x} \right)^3 (x^2 - 1)$$

$$\left[ \left( \frac{2x^2 + 1}{x} \right)^2 \left( \frac{6x^4 - x^2 + 1}{x^2} \right) \right]$$

*Calcolare le derivate delle seguenti funzioni irrazionali:*

$$y = \sqrt{x}$$

$$\left[ \frac{1}{2\sqrt{x}} \right]$$

$$y = \sqrt[3]{x^2 - 7x}$$

$$\left[ \frac{2x-7}{\sqrt[3]{(x^2 - 7x)^2}} \right]$$

$$y = \sqrt{x^2 + 2}$$

$$\left[ \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}} \right]$$

$$y = \sqrt{4x^2 - 3}$$

$$\left[ \frac{4x}{\sqrt{4x^2 - 3}} \right]$$

$$y = \sqrt{x^3 - 4x + 2}$$

$$\left[ \frac{3x^2 - 4}{2\sqrt{x^3 - 4x + 2}} \right]$$

$$y = \sqrt{x^4 + x^2 - 2x}$$

$$\left[ \frac{2x^3 + x - 1}{\sqrt{x^4 + x^2 - 2x}} \right]$$

$$y = (x-1)\sqrt{x^2+1} \quad \left[ \frac{2x^2-x+1}{\sqrt{x^2+1}} \right]$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \left[ \frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} \right]$$

$$y = \sqrt[5]{5x+3} \quad \left[ \frac{1}{\sqrt[5]{(5x+3)^4}} \right]$$

$$y = \sqrt[3]{4x^3+6x^2-5} \quad \left[ \frac{4x(x+1)}{\sqrt[3]{(4x^3+6x^2-5)^2}} \right]$$

$$y = \frac{\sqrt{x}}{x+2} \quad \left[ \frac{2-x}{2\sqrt{x}(x+2)^2} \right]$$

$$y = \sqrt[5]{(2x^3+1)^2} \quad \left[ \frac{12x^2}{5\sqrt[5]{(2x^3+1)^3}} \right]$$

$$y = 8x + \sqrt{x} \quad \left[ 8 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right]$$

$$y = \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x-1} \quad \left[ \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \right]$$

$$y = 2\sqrt{x} + 2x + 1 \quad \left[ \frac{1}{\sqrt{x}} + 2 \right]$$

$$y = (x^2 + 2\sqrt{x})^5 \quad \left[ 5(x^2 + 2\sqrt{x})^4 \left( 2x + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \right]$$

$$y = 2\sqrt{x^3} - \frac{7}{\sqrt[7]{x}} + 4\sqrt[4]{x^3} \quad \left[ 3\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[7]{x^8}} + \frac{3}{\sqrt[4]{x}} \right]$$

$$y = \sqrt[4]{x} - \frac{1}{\sqrt[4]{x}} \quad \left[ \frac{\sqrt{x}+1}{4x\sqrt[4]{x}} \right]$$

$$y = x^7 - 3\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x^3}} \quad \left[ 7x^6 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{3}{4x\sqrt[4]{x^3}} \right]$$

$$y = \frac{2x-1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\left[ \frac{x+2}{\sqrt{(x^2+1)^3}} \right]$$

$$y = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\left[ 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \right]$$

$$y = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\left[ \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2-1}} \right]$$

$$y = \frac{1}{x} - \frac{4}{x^2} + \sqrt{x} - 5\sqrt[3]{x^2}$$

$$\left[ -\frac{1}{x^2} + \frac{8}{x^3} + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{10}{3\sqrt[3]{x}} \right]$$

$$y = 8\sqrt{x} - 7\sqrt[3]{x^2}$$

$$\left[ \frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{14}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \right]$$

$$y = 4\sqrt{x} + 16\sqrt[4]{x}$$

$$\left[ \frac{2\sqrt{x} + 4\sqrt[4]{x}}{x} \right]$$

$$y = 25x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} - 7$$

$$\left[ 50x - \frac{1}{2x\sqrt{x}} \right]$$

$$y = \sqrt{2}x^3 - 4\sqrt[5]{x} + 25$$

$$\left[ 3\sqrt{2}x^2 - \frac{4}{5\sqrt[5]{x^4}} \right]$$

$$y = x\sqrt[3]{x^2 - 1}$$

$$\left[ \frac{5x^2 - 3}{3\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}} \right]$$

$$x + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{5}{\sqrt[5]{x}}$$

$$\left[ \frac{x^2 - \sqrt{x} - \sqrt[5]{x^4}}{x^2} \right]$$

$$y = \frac{x^4 + 4x}{\sqrt{x}}$$

$$\left[ \frac{7}{2}x^2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right]$$

$$y = 2x\sqrt{x} - \frac{1}{4}\sqrt[3]{x\sqrt{x}} + 2x^6 - 3$$

$$\left[ 3\sqrt{x} - \frac{1}{8\sqrt{x}} + 12x^5 \right]$$

$$y = \frac{\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[5]{x^2}}{x\sqrt{x}}$$

$$\left[ -\frac{23}{30x^{30}\sqrt[30]{x^{23}}} \right]$$

$$y = \frac{1 + \sqrt[4]{x^3}}{1 - \sqrt[4]{x^3}}$$

$$\left[ \frac{3}{2\sqrt[4]{x}(1 - \sqrt[4]{x^3})^2} \right]$$

$$y = \frac{2 - \sqrt[3]{x^2}}{2 + \sqrt[3]{x^2}}$$

$$\left[ -\frac{8}{3\sqrt[3]{x} \left( 2 + \sqrt[3]{x^2} \right)^2} \right]$$

$$y = \frac{x^3 + \sqrt{x}}{x^2 + 3}$$

$$\left[ x^4 + 9x^2 - \frac{3}{2}x\sqrt{x} + \frac{3}{2\sqrt{x}} \right]$$

$$y = (15x^2 - 12x + 8) \sqrt{(x+1)^3}$$

$$\left[ \frac{105}{2}x^2\sqrt{x+1} \right]$$

$$y = \left( \sqrt[3]{x} - \frac{1}{2}x^2 + \sqrt[5]{x^3} \right)^2$$

$$\left[ 2 \left( \sqrt[3]{x} - \frac{1}{2}x^2 + \sqrt[5]{x^3} \right) \left( \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} - x + \frac{3}{5\sqrt[5]{x^2}} \right) \right]$$

$$y = \frac{x - \sqrt{x^2 + 4}}{7x + 1}$$

$$\left[ \frac{\sqrt{x^2 + 4} - x + 28}{(7x+1)^2 \sqrt{x^2 + 4}} \right]$$

$$y = \frac{\sqrt{2-x^2} + x}{3+x}$$

$$\left[ \frac{-3x - 2 + 3\sqrt{2-x^2}}{(3+x)^2 \sqrt{2-x^2}} \right]$$

$$y = \frac{3-x^2}{\sqrt[3]{x+2}}$$

$$\left[ \frac{-5x^2 - 12x - 3}{3\sqrt[3]{(x+2)^4}} \right]$$

$$y = \frac{x^5 - x^3}{\sqrt{x+1}}$$

$$\left[ \frac{x^2(9x^2 - x - 6)}{2\sqrt{x+1}} \right]$$

$$y = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$$

$$\left[ \frac{x+2}{2(x+1)\sqrt{x+1}} \right]$$

$$y = x \cdot \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

$$\left[ -\frac{2x}{(1+x)^2 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} \right]$$

$$y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} \left( \frac{1}{x^2} + 2 \right)$$

$$\left[ \frac{-2x^4 + x^2 + 4}{x^4 \sqrt{x^2 - 1}} \right]$$

*Calcolare le derivate delle seguenti funzioni esponenziali e logaritmiche:*

$$y = \ln(2x-1)$$

$$\left[ \frac{2}{2x-1} \right]$$

$$y = \ln(x+3)$$

$$\left[ \frac{1}{x+3} \right]$$

$y = e^{x+1}$	$[e^{x+1}]$
$y = xe^x$	$[(1+x)e^x]$
$y = e^{5-x^2}$	$[-2xe^{5-x^2}]$
$y = \frac{x^4+1}{e^4+1}$	$\left[ \frac{4x^3}{e^4+1} \right]$
$y = x \ln x$	$[\ln x + 1]$
$y = x^2 \ln x + 3x$	$[2x \ln x + x + 3]$
$y = e^{-\frac{3}{x^2}}$	$\left[ \frac{2}{x^3} e^{-\frac{3}{x^2}} \right]$
$y = e^{\sqrt{x}}$	$\left[ \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} \right]$
$y = \frac{\ln x - 1}{\ln x + 1}$	$\left[ \frac{2}{x(\ln x + 1)^2} \right]$
$y = x^3 e^x + e^x - 1$	$[e^x(x^3 + 3x^2 + 1)]$
$y = e^x(2 - e^x)$	$[2e^x(1 - e^x)]$
$y = e^x(x^3 - x + 7)$	$[e^x(x^3 + 3x^2 - x + 6)]$
$y = x \ln^3 x - 3x \ln^2 x + 6x \ln x - 6x$	$[\ln^3 x]$
$y = x^2 (\ln x)^3$	$[x(\ln x)^2(2 \ln x + 3)]$
$y = 5x \ln^2 x - 6x^3 \ln^5 x$	$[-18x^2 \ln^5 x - 30x^2 \ln^4 x + 5 \ln^2 x + 10 \ln x]$
$y = \frac{1}{x} \cdot \ln x$	$\left[ \frac{1}{x^2}(1 - \ln x) \right]$
$y = (x \ln x - 1)^2$	$[2(x \ln x - 1)(\ln x + 1)]$
$y = 3x \ln x$	$[3(\ln x + 1)]$
$y = x^2 \ln x$	$[x(2 \ln x + 1)]$
$y = x \ln^3 x$	$[\ln^2 x(\ln x + 3)]$
$y = \frac{1}{2} \ln^2 x - \ln x + \sqrt{x}$	$\left[ \frac{2 \ln x - 2 + \sqrt{x}}{2x} \right]$
$y = \ln \left( x + \sqrt{4 + x^2} \right)$	$\left[ \frac{1}{\sqrt{4 + x^2}} \right]$

$$y = \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$$

$$\left[ \frac{x^2 - 2}{x^3(x-1)} \right]$$

$$y = \ln^2 x + 3x + 5$$

$$\left[ \frac{2\ln x + 3x}{x} \right]$$

$$y = 4x\ln^4 x + 7x^5\ln^5 x$$

$$\left[ \ln^3 x (35x^4\ln^2 x + 35x^4\ln x + 4\ln x + 16) \right]$$

$$y = \frac{\ln x}{x^2}$$

$$\left[ \frac{1}{x^3} (1 - 2\ln x) \right]$$

$$y = x\sqrt{1+x^2} + \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$$

$$\left[ 2\sqrt{1+x^2} \right]$$

$$y = \ln(x^2 - 7x - 8)$$

$$\left[ \frac{2x - 7}{x^2 - 7x - 8} \right]$$

$$y = (x-1)\ln^3 x$$

$$\left[ \frac{x\ln^3 x + 3(x-1)\ln^2 x}{x} \right]$$

$$y = e^{x^2 - 2x}$$

$$\left[ 2(x-1)e^{x^2 - 2x} \right]$$

$$y = xe^{\frac{x-1}{x}}$$

$$\left[ e^{\frac{x-1}{x}} \cdot \frac{x+1}{x} \right]$$

$$y = \ln^5 \sqrt[5]{x^2 + 4}$$

$$\left[ \frac{2x}{5(x^2 + 4)} \right]$$

$$y = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) + \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2}$$

$$\left[ \frac{1}{x^3(x+1)} \right]$$

$$y = \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

$$\left[ -\frac{1}{x(x-1)} \right]$$

$$y = \ln(x^3 + x^2 + 8)$$

$$\left[ \frac{3x^2 + 2x}{x^3 + x^2 + 8} \right]$$

$$y = \ln^3 \sqrt[3]{4x^2 + 5x - 1}$$

$$\left[ \frac{8x + 5}{3(4x^2 + 5x - 1)} \right]$$

$$y = \ln \sqrt{\frac{x^2 + 1}{2x + 3}}$$

$$\left[ \frac{x^2 + 3x - 1}{(2x+3)(x^2+1)} \right]$$

$$y = \sqrt{\ln(x^2 + 4)}$$

$$\left[ \frac{x}{(x^2 + 4)\sqrt{\ln(x^2 + 4)}} \right]$$

$$y = \sqrt[3]{\ln x + \sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\left[ \frac{1}{3\sqrt[3]{\ln x + \sqrt{x^2 + 1}}} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) \right]$$

$$y = \frac{1}{x^2} \ln^3(2x + \sqrt[5]{x})$$

$$\left[ -\frac{2}{x^3} \ln^3(2x + \sqrt[5]{x}) + \frac{6}{x^2} \frac{\ln^2(2x + \sqrt[5]{x})}{2x + \sqrt[5]{x}} + \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}} \right]$$

$$y = \ln \left( \frac{\sqrt{e^x}}{1 + \sqrt{1 + e^x}} \right)$$

$$\left[ \frac{e^{\sqrt{x}} (2\sqrt{1 + e^x} + e^x + 2)}{4\sqrt{1 + e^x}} \right]$$

$$y = \frac{\ln x - 1}{\ln x + 1}$$

$$\left[ \frac{2}{x(\ln x + 1)^2} \right]$$

$$y = \frac{e^x + 1}{2 - e^x}$$

$$\left[ \frac{3e^x}{(2 - e^x)^2} \right]$$

$$y = \frac{e^x}{x^3 + x^2}$$

$$\left[ \frac{e^x (x^3 - 2x^2 - 2x)}{(x^3 + x^2)^2} \right]$$

$$y = \frac{\ln x}{1 + \ln x}$$

$$\left[ \frac{1}{x(1 + \ln x)} \right]$$

$$y = \ln(\ln x)$$

$$\left[ \frac{1}{x \ln x} \right]$$

$$y = \ln(e^x - 2)$$

$$\left[ \frac{e^x}{e^x - 2} \right]$$

$$y = \ln(5e^x \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\left[ \frac{x^2 + x - 1}{x^2 - 1} \right]$$

$$y = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 1) + x$$

$$\left[ \frac{x^2 + x - 1}{x^2 - 1} \right]$$