



LABBRA





# APERTURA BOCCALE

**Confini:** labbra



**Funzione:** ingestione e masticazione

**Aspetto:** rima buccale più corta e larga in teste corte o brachicefale.

Pregio rima ampia nei cani da presa, possibilmente corta nei cani da cerca.

Nel verro, lascia fuoriuscire i canini inferiori (carattere sessuale)

**Difetti:** rima poco aperta: Rima sempre aperta per problemi dentari o mandibolari (prognatismo, enognatismo). Posizione e aspetto dei denti: chiusura a forbice o a tenaglia nei cani.





CORRECT TEETH




Overshot



Undershot





## GIOGAIA O PAGLIOLAIA

**Base anatomica e Confini** : piega cutanea tipica dei bovini che partendo dal mento si estende dalla gola fino alla regione sternale. : naso, guance, rima buccale.

**Aspetto**: più o meno ampia e spessa in funzione della razza (carattere distintivo). Indicatore dello spessore cutaneo e segno di rusticità. Incidenza sulla resa al macello.

**Difetti**: sovrabbondante, molle o flaccido. Indice di linfatismo in razze canine.

**Tare**: lesioni cutanee



## CORNA

**Base anatomica:** cavicchia ossea del frontale, astuccio corneo e derma papillare

**Confini :** sincipite

**Aspetto:** si devono considerare

presenza o assenza

posizione

forma, dimensioni

direzione

(eventuale decornazione)

## CORNA

**Nei bovini:** hanno forma generalmente conica, con sezione ellittica o circolare, presentano delle cerchiature che possono essere indicative dell'età dell'animale

sono in genere più lunghe e sottili nelle femmine, corte e tozze nei maschi, anche se le dimensioni dipendono strettamente dall'ambiente e dall'età dell'animale

Possono essere indicative di alcune razze: a corona in Frisona e Jersey, a lira stretta nella Bruna, a lira nella Maremmana e Romagnola, lunate nella Podolica. Alcune razze sono acherate: Aberdeen Angus; di altre sono stati selezionati ceppi privi di corna: Hereford, Charolaise



## CORNA

**Negli ovini:** hanno forma generalmente “piramidale” , con sezione triangolare o ellittica, presentano delle cerchiature che non hanno significato di età

la presenza e lo sviluppo sono strettamente correlati al sesso

Possono essere indicative di alcune razze: corna in ambo i sessi nella Dorset Horn; corna nei soli maschi nella Sopravissana, nella Merinos e nella Gentile di Puglia.

Molte razze sono acherate, in entrambi i sessi: Delle Langhe, Bergamasca, Comisana, Ile de France

a spirale



acherate



provided by Dr. Paolo Bani

## CORNA

**Nei Caprini:** hanno forma generalmente “piramidale” , con sezione triangolare o ellittica, presentano delle cerchiature che non hanno significato di età

la presenza e lo sviluppo sono strettamente correlati al sesso; la forma è tipica di alcune razze

## CORNA

Possono essere indicative di alcune razze: sia nei maschi che nelle femmine in Camosciata delle Alpi (a scimitarra); Girgentana (a cavaturacciolo); Saanen (a scimitarra). Presenza o assenza nella Sarda. Acherata invece la Maltese.



## ORECCHIO

**Base anatomica:** cartilagine del padiglione auricolare

**Confini:** parotidi, fronte, nuca, sincipite e tempie

Funzione: udito. Molto mobili nel cavallo e cane; poco in bovini, suini, ovicaprini.

**Aspetto:** si valuta l'attaccatura, il portamento, la forma e le dimensioni.

- Nei suini: Landrace e Large White

- Nei cani: diritte con apertura in avanti (P. Tedesco, P. Belgi, Cirneco dell'Etna, Volpino It.); semipendenti (nella 1/2 sup. - boxer, Alano); pendenti (cani da ferma, segugi, S. Bernardo). La lunghezza è variabile in base alla funzione: bracco italiano, segugi, bloodhound. Corto e rivolto indietro: levrieri.

**Difetti:** anomala lunghezza. Portamento anomalo. **Tare:** lesioni cutanee. Otoematoma nei suini. Orecchie come area di marchiatura.



ORECCHIO





© Oklahoma State University

Provided by Carlos Eduardo Azevedo Souza

**BERGAMASCA**



provided by Dr. Paolo Bani

**APPENNINICA**



**COMISANA**



provided by Dr. Paolo Bani

**DELLE LANGHE**



from Lane d'Italia

**SARDA**



provided by Gary Onan

**TEXEL**

**ORECCHIO negli OVINI (utile ai fini etnici)**



# OCCHIO

**Base anatomica:** globo oculare, palpebre e relativi annessi

**Confini:** fronte, naso, guance

**Funzione:** vista, espressione.

**Aspetto:** indicativo di specie e di razza, nella forma, posizione e colore.

Sono in genere grossi e sporgenti nel bovino, più piccoli nel suino. Nel cane si osservano:

- lo sguardo: dolce e malinconico dello Spinone, ardente del Pointer
- la posizione: frontale (bull-dog), subfrontale (pointer), semilaterale (bracco it.), laterale (collie), ultralaterale (borzoi)
- forma: in relazione alla posizione
- distanza fra gli occhi
- grado di adesione palpebrale
- colore dell'iride (in relazione con le macchie scure del mantello o al colore delle mucose)

**Difetti:** di posizione e forma. Palpebrali (entropion, ectropion, ptosi palpebrale, districhiasi). Dell'iride (occhio gazzuolo), eterocromia. Occhio  
Nei cuccioli: azzurri fino a 3 mesi circa.



OCCHIO



## COLLO

**Collo+attacco testa+attacco tronco=incollatura**

**Importanza:** Bilanciere cervico-cefalico

- statica: regola l'equilibrio spostando il centro di gravità
- dinamica: favorisce con i suoi spostamenti le diverse andature
  - Galoppatore: collo lungo, che sposta maggiormente il baricentro in avanti garantendo maggiore velocità, fornisce una più ampia contrazione dei suoi muscoli favorendo l'irrigidimento ed il sollevamento del rachide e scaricando il posteriore
  - Trottatore: collo più corto e portato in posizione normale

**Base anatomica:** 6 vertebre cervicali dopo la prima (che fa parte della nuca), legamento nucale e relativi muscoli

**Confina con:** testa, garrese, spalle, petto

**Valutazione:** dimensioni, forma e profilo,direzione, attacco

## COLLO

### **Dimensioni:**

**Lunghezza:** dalla estremità superiore (nuca) alla metà del margine anteriore delle spalle – può essere lungo o corto

**Spessore:** pesante o leggero





corto



corto e spesso



Spesso con testa piccola



sottile

## COLLO

### **Forma e profilo:**

Diritto o piramidale: quando i margini inferiore e superiore sono paralleli

Arcuato: quando il margine dorsale è convesso su tutta la sua lunghezza  
(brachimorfi)

### *Difetti:*

Collo di cigno: convesso solo nella parte prossimale

Collo di cervo: margine dorsale concavo

Collo lacerto: margine inferiore convesso






lacerto

## COLLO

**Direzione:** rispetto all'orizzontale, con riflessi sull'angolazione della spalla  
Normale, verticale, orizzontale



orizzontale



normale



verticale


## COLLO


**Attacco:** alla testa (normale, placcata, scucita)  
al tronco

normale,

colpo di accetta: depressione dorsale davanti al garrese


colpo di lancia: depressione laterale davanti alla spalla







# TRONCO



Parte anteriore: cavità toracica


Parte posteriore: cavità addominale e cavità pelvica

## Le regioni del Piano dorsale:

- 1 Garrese
- 2 Dorso
- 3 Lombi
- 4 Groppa
- 5 Coda




provided by Hoard's Dairyman




## La base anatomica delle regioni del Piano dorsale:

- 1 Garrese: prime 5-6 vert dorsali nel bovino  
prime 8-9 vert dorsali nel cavallo
- 2 Dorso: restanti 7-8 vert dorsali nel bovino  
restanti 9-10 vert dorsali nel cavallo
- 3 Lombi: 6 vertebre lombari
- 4 Groppa: sacro e prime coccigee e coxali
- 5 Coda: restanti vertebre coccigee



provided by Hoard's Dairyman



## GARRESE

**Base anatomica:** processi spinosi prime vertebre dorsali, legamento sovraspinoso, muscoli trapezio, romboide, lungo del dorso, lungo spinato

**Confini:** margine caudale del collo, spalle, margine ant del dorso

**Funzione:** rilievo di valutazione dell'altezza; punto di leva per i muscoli del dorso e del collo al fine di scaricare l'impulso motorio dal posteriore all'anteriore; importante per l'altezza del passo

**Aspetto:** si valuta l'altezza, la lunghezza e la copertura.

Nei cavalli e nei cani sportivi: deve essere alto e asciutto

**Difetti:** garrese basso (galoppo pesante); garrese imbottito o grasso (tipo razze pesanti agricole); garrese tagliente (animali anziani o denutriti)

**Tare:** lesioni cutanee (fiaccature da sella o lesioni da morsicature se allevati in branchi). Mal del garrese.



tagliente



alto e tagliente



tagliente in cavallo denutrito



basso



Basso e largo



troppo lungo



mal del garrese

## DORSO

**Base anatomica:** processi spinosi restanti vertebre dorsali, parte prossimale costole corrispondenti, legamento sovraspinoso, porzione toracica trapezio, romboide, lungo dorsale, trasverso spinoso e interspinoso

**Confini:** margine caudale garrese, costato, margine ant lombi

**Funzione:** asse di trasmissione dell'impulso meccanico dal post all'ant

**Aspetto:** si valuta la lunghezza, la larghezza, la direzione e il profilo.

*Lunghezza:* in rapporto alla mole e tipo di animale, breve nei cavalli da tiro e nei tipi brachimorfi, lungo nei cavalli e cani sportivi

*Larghezza:* maggiore nei tipi da carne e brachimorfi (dorso doppio), minore nei dolicomorfi

*Direzione e profilo:* in genere orizzontale con profilo rettilineo in modo da garantire sostegno ai visceri e corretta trasmissione dell'impulso.