



Obiettivo



Ottenere il primo parto a 2 anni e poi 1 parto all'anno


1							
Nascita Nascita	Fecondaz.	1º Parto	Fecondaz.		2º Parto	Fecondaz.	
0	15	24	27		36	39	

Tempo (mesi)

PERCHÉ SI FA




Per prevenire/contrastare il bilancio energetico negativo tipico del post-partum




CALO DELLE RISERVE CORPOREE





BILANCIO ENERGETICO NEGATIVO






Days of lactation

QUANDO SI FA



(COME EVOLVE NEL TEMPO)



EVOLUZIONE IDEALE




Andamento del Body condition Scores ideale

Momento	Punteggio
Parto	3.25 – 3.75 (4 primipare)
1 mese post-partum	2.5 - 3.0
Metà lattazione	3.0 - 3.50
Fine lattazione/ Messa in asciutta	3.25 - 3.75


Obiettivo








Conseguenze dismetaboliche Se non si rispetta l'indicazione





Conseguenze patologiche Se non si rispetta l'indicazione



1. Sindrome della vacca a terra

- 1. Collasso Puerperale Ipocalcemico
- Altre cause (Coma Epatico, Compressione nervo sciatico, Tossinfezioni da Coli e/o Clostridi ecc...).

2. Infiammazioni

- 1. Uterine (Metriti da blocco delle lochiazioni)
- 2. Mammarie (Mastiti)
- 3. Podali (Laminiti o Podoflemmatiti).


3. Ipofertilità

- 1. Ritardo ripresa ciclo estrale
- Calori silenti

COME SIFM (1)



BCS



COME SIFM (2)



BODY CONDITION SCORE	Lumbar vertebrae Rear view (cross-section) of the hook bones		Side view of the line between the hook and the pin bones	Cavity between tail	head and pin bone SIDE VIEW
1 grave denutrizione	*				
2 intelaiatura ossea visibile	&				
intelaiatura ossea e strati adiposi ben bilanciati	4			1	A
4 intelaiatura ossea poco visibile e coperta da strati adiposi	*			1	T
5 obesità	*			77	K

COME SIFM (3)



Punti di repere per l'esame ispettivo per il BCS

- 1. LEGAMENTO SACRO-ISCHIATICO (base della coda) è il più importante nelle vacche da latte perché non vi sono muscoli e quindi eventuali tessuti molli sono indiscutibilmente adipe. Altri punti di repere:
- 2. Vista superiore (dall'alto) della **groppa**, osso sacro, ilei (anche), ischi (natiche),
- 3. Vista laterale del tronco: fossa del fianco fra processi trasversi delle vertebre lombari, costato (margine caudale) e punta delle anche (ali dell'ileo); la fossa del fianco è il punto di repere meno indicativo perché si presta a valutazioni errate per riempimento addominale da: ingesta (contenuto del digerente), gas nel digerente (meteorismo timpanismo), gravidanza (feto/i con invogli).